

# 国家市场监督管理总局

## 保健食品产品技术要求

BJG20050165

### 核乐牌同逸胶囊

<拼音>

**【生产工艺】** 生产工艺说明 第一、黄精、桑叶提取物 1、黄精、桑叶精选去杂后，分别用粉碎机粉碎，细度约为20目，按比例投料，进入热水浸提工序。 2、热水浸提。将物料置不锈钢提取罐中，按物料：去离子水=1：6的比例加离子水，蒸汽加温至100℃浸提3h，然后过滤。滤渣重复浸提一次，合并两次滤液。 3、减压浓缩。将上述滤液置于真空度为90%减压浓缩罐中，于85℃浓缩2.5h至比重达1.2左右，制得浸膏后，进行喷雾干燥。 第二、破壁油菜花粉 1、油菜花粉控制在50℃用木瓜蛋白酶与 $\alpha$ -淀粉酶进行酶解破壁，时间32h，制成破壁油菜花粉。 第三、将破壁油菜花粉与桑叶提取物，黄精提取物置混合机内10分钟，然后置干燥箱于80℃烘干。 第五、将烘干的基料进行粉碎，添加维生素C、B1、B2以及山梨酸钾进行混合，制成原粉。 第六、取富铬酵母与上述原粉置混后机内混合，进行含量测定，于远红外85℃杀菌3h，空气洁净度达10万级的车间内，以自动装囊机填充胶囊和包装。 第七、以上基料的水份进行严格控制。 第八、制胶囊、包装洁净间内要求： A、操作前，后均要开紫外灯空气杀菌 1 小时； B、各工序操作人员要求三穿两戴，限制非操作人员进入； C、制胶囊、包装间装置空气净化系统，空气洁净度为10万级； D、工作完毕，将合用的物料、器具，按规定清洗； E、贯彻卫生检查制度。

**【保健功能】** 调节血糖

**【食用方法及食用量】** 每日早午各1次，每次5粒，宜多喝水

**【贮藏】** 置阴凉干燥处

**【保质期】** 24个月

---

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改